



НЕДЕЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК



ГЕНРИХ ГЕРМАН РОБЕРТ КОХ (1843 – 1910)

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о выделении бактерии, вызывающей туберкулёз — *Mycobacterium tuberculosis*, которую позже называли палочкой Коха. Это открытие **стало важным этапом в борьбе с заболеванием.**

В 1982 году, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулёзом и лёгочными заболеваниями, **был учреждён Всемирный день борьбы с туберкулёзом.**



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК




ТУБЕРКУЛЁЗ-ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ,

которое вызывается бактериями и чаще всего поражает лёгкие.

- Он распространяется по воздуху при кашле, чихании или отхаркивании больных туберкулёзом людей.

- Современный уровень развития медицины позволяет **полностью вылечить туберкулёз лёгких, т.е. добиться ликвидации активного процесса.**



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК



СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Туберкулёз возникает в результате размножения бактерий в организме и поражения различных органов.

СИМПТОМЫ:

- длительный кашель (иногда с кровью)
- боль в груди
- слабость
- повышенная утомляемость
- снижение массы тела
- лихорадка
- ночная потливость




ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК



ПОВЫШЕННОМУ РИСКУ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗОМ МОГУТ ПОДВЕРГАТЬСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ:

- страдают диабетом
(высокий уровень сахара в крови)
- имеют ослабленную иммунную систему (например, в результате ВИЧ-инфекции или СПИДа)
- страдают от неполноценного питания
- употребляют табак
- злоупотребляют алкоголем.



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК



ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ

- При появлении симптомов туберкулёза немедленно обращайтесь за медицинской помощью. Раннее лечение помогает предотвратить распространение инфекции и повышает шансы на выздоровление.
- Проходите регулярное тестирование, особенно если подвержены высокому риску заражения.
- Химиопрофилактика предотвращает развитие болезни у людей, инфицированных микобактерией туберкулёза.
- Соблюдение правил гигиены при кашле снижает риск передачи инфекции: избегайте контактов с окружающими, носите маску, прикрывайте рот и нос при кашле/чихании, правильно утилизируйте мокроту и использованные салфетки.
- Для предотвращения распространения туберкулёза в медицинских и других учреждениях важно использовать респираторы и обеспечивать качественную вентиляцию помещений.



ГБУЗ «ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ» МЗ КК

